



ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดกรอบดุลยพินิจพิจารณาวินิจฉัยการตรวจร่างกาย

ตามข้อ ๑๔ ของบัญชีโรคหรืออาการที่ไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจ ตามข้อ ๒ (๑๔)

แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับการตรวจร่างกายข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก

ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนเตรียมทหารในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นักเรียนนายสิบตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี ๒๕๕๙

เพื่อให้การดำเนินการตรวจร่างกายข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนเตรียมทหารในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายสิบตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม คณะกรรมการจึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๔ ของบัญชีโรคหรืออาการที่ไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจ ตามข้อ ๒ (๑๔) แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดกรอบดุลยพินิจในการพิจารณาวินิจฉัยการตรวจร่างกาย ดังต่อไปนี้

๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ

๑.๑ ศีรษะและหน้าผกผิดปกติจนน่าเกลียด

๑.๒ รูปร่างผิดปกติ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง ริมฝีปากแหว่ง  
เขี้ยว หรือหูไม่ลง

- รวมถึงความผิดปกติชนิดเพดานโหว่

๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน

- การขยับของคอหรือไหล่ หากเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่าผ่าน

- หากเป็นมาก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกาหลังได้  
ไม่ถึงกลางหลัง ให้ถือว่าไม่ผ่าน

๑.๔ แขนขา

๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดปกติจนมองเห็นได้ชัดเจน

- ชายยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๒ เซนติเมตรและเดินกะเผลกชัด วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยัง  
ตาตุ่มด้านในทั้ง ๒ ข้าง ต้องนอนตัวตรงไม่บิดเอียง

- แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจากกระดูกหัวไหล่ (Acromion)  
ถึงปลายนิ้วกลาง ขณะที่ข้อไหล่หุบเข้าและข้ออื่นอยู่ในท่ากลาง (Neutral Zero Position)

๑.๔.๒ โคน้ำเข้าหรือโคน้ำออก

- *เข้าโคน้ำออก เข้าโง่ง ประมาณความกว้าง ๔ นิ้วมือ (๗ - ๘ เซนติเมตร) ยืนตรง ฝ่ามือ ๔ นิ้ว สอดผ่านได้*

- *เข้าชิด ปลายเท้าจะห่าง (Valgus Knee) หากห่างกันเกิน ๔ นิ้วมือ (๗ - ๘ เซนติเมตร) ที่ตามตุ่มด้านใน*

- *แขนคอก (Cubitus Varus)*

๑.๔.๓ บิดเก

๑.๕ มือหรือเท้า

๑.๕.๑ บิดเก

- *โดยดูจากการทำงานของมือและเท้า มือกำแบ กระจกข้อมือ ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้*

๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน

๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ

๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไม่ถนัด

- *โดยดูจากการทำงานของมือและเท้า มือกำแบ กระจกข้อมือ ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้*

๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน

๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดปกติ

- *กรณีเดินแบะอย่างหนึ่ง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้า ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง (Rigid type)*

๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ

๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้

๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ

๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป

๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ

๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโง่ง หรือแอ่น

- *Scoliosis ใช้การยืน ก้มตัว ให้ลำตัวขนานกับพื้น แล้วดูว่าหลังบิดงอขึ้นผิดปกติหรือไม่*

- *กรณีเอ็กเซอร์เซ่ หากพบ Scoliosis ที่มีมุมมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕ องศา ให้ถือว่าไม่ผ่าน*

๒.๖ เท้าบุก (CLUB FOOT)

๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)

๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดปกติ

๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ

### ๓. ผิวหนัง

๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น

- รวมถึงเนื้องอกเล็ก ๆ เป็นปุ่ม ๆ ที่ผิวหนัง (MOLLUSCUM CONTAGIOSUM)

- กรณีแผลเป็น (คีลอยด์) ไม่ ปาน รอยสัก ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมกันมีขนาดเกิน

### ๑๖ ตารางเซนติเมตร

๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา

๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป

๓.๔ คนเผือก

### ๔. ตา หู คอ จมูก

๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด

๔.๒ ต้อกระจก

๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาตำขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า

๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus)

๔.๕ หนังตาดก หรือหนังต้าม้วนออกนอก หรือหนังต้าม้วนเข้าใน

๔.๖ หนังตาแหงจนเสียรูป

๔.๗ หนังตาบิดไม่สนิท

๔.๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง

๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร

๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัด

๔.๑๑ ต้อหิน

๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันและความกว้างต่างกันมาก

๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด

๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด

๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง

๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง

### ๕. ฟัน

๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

- ฟันผุตั้งแต่ ๕ ซี่ขึ้นไป

๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่

๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว

๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน

๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

## ๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด

- ๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๑๐ (หนึ่งร้อยสิบ) ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๕ (สี่สิบห้า) ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อก (AV Block) หรือเต้นผิดปกติชนิด เอเทรียลไฟบริลเลชันหรือเอเทรียลฟลัตเตอร์
- ๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
- ๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
- ๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
- ๖.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด
- ๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
- ๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว / ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
- ๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
- ๖.๙ หลอดเลือดดำขดอยู่ที่อุ้งอัมตะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

## ๗. ระบบหายใจ

- ๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
- ๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
- ๗.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
  - พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ
- ๗.๕ โรคหืด
- ๗.๖ ปอดอักเสบ
  - ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

## ๘. ระบบทางเดินอาหาร

- ๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้อัลตราซาวด์
- ๘.๒ ตับแข็ง
- ๘.๓ ฝีที่ตับ
- ๘.๔ ดีซ่าน
- ๘.๕ ท้องมาน
- ๘.๖ รูแผลเรื้อรังจากฝีสุตา หรือไขสันหลังที่ผนังหน้าท้อง
- ๘.๗ ไล่เลื่อนทุกชนิด
- ๘.๘ รีดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
- ๘.๙ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกมาทวารหนัก
- ๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร

๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค

๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง

- ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรือน้ำตาล

๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต

๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด

๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ

๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ

๙.๖ กามโรค

๙.๗ ภาวะกะเทย (HERMAPHRODISM)

๙.๘ ผังมูกที่อวัยวะเพศ

- ให้ความรู้ถึงชนิดหรือทำสิ่งผิดธรรมชาติที่อวัยวะเพศ

- ให้ความรู้ถึงการฉีดสารน้ำมันหรือสารสังเคราะห์อื่นใด เข้าไปในอวัยวะอื่นใดในร่างกาย

๙.๙ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ

- ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว

๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว

๑๐. ระบบจิตประสาท

๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท

๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง

๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง

๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม

๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ

๑๐.๖ โรคลมชัก (EPILEPSY)

๑๑. เบ็ดเตล็ด

๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)

- ให้นำผลการตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม่จำเป็นต้องเจาะ Thyroid Function Test เว้นแต่หากอาการไม่ครบ ให้ยืนยันผลการวินิจฉัยด้วยการเจาะ Thyroid Function Test ได้

๑๑.๒ โรคเก๊าท์

๑๑.๓ โรคอ้วนพื้จากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA)

- รวมถึงเต้านมผิดปกติในผู้ชาย (Gynecomastia) และความผิดปกติต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมนในร่างกาย

๑๑.๔ เบาหวาน

๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)

๑๑.๖ โรคอ้วนพี (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BODY MASS INDEX) ตั้งแต่สามสิบห้า กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป

๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย

- โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า ๙ g/dl ในผู้หญิงและน้อยกว่า ๑๐ g/dl ในผู้ชาย หรือ

- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC) พบความผิดปกติของลักษณะเม็ดเลือดแดง (Abnormal Red Blood Cell Morphology) ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า ๖๐ fl ทั้งนี้ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปรสิต

๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)

๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (YAWS)

๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

๑๑.๘.๕ โรคเอดส์

๑๑.๙ เนื้องอก

๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่

๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด

๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง

๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลตำรวจโท

สมบุญ

(สมบุญ ตันตระกูล)

นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘)